УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

_____ Н.А. Власов
22 ИЮЛ 2010

ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства Дезолайн-Ф для дезинфекции объектов ветнадзора и профилактики инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, включая птиц

(организация-производитель ООО «Ветбиохим», г. Ставрополь)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Дезолайн-Ф (Dezoline-F) – средство для дезинфекции объектов ветнадзора и профилактики инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, включая птиц.
2. Дезолайн-Ф – дезинфицирующее средство в форме раствора, в 100 мл которого в качестве действующих веществ содержится 5,0 г бензалкония хлорида, 7,5 г глутарового альдегида, 7,5 г формальдегида, а в качестве вспомогательного компонента – вода до 100 мл.
3. Дезолайн-Ф по внешнему виду представляет собой прозрачную бесцветную или светло-желтую жидкость.
4. Выпускают дезинфицирующее средство расфасованным по 1 $дм^3$ в пластиковые флаконы и по 5 и 10 $дм^3$ в полимерные канистры соответствующей вместимости.

На флаконы и канистры наклеивают этикетки с указанием наименования организации-производителя, ее адреса, обозначения СТО, наименования и назначения средства, объема средства во флаконе (канистре), названия и содержания действующих веществ, номера серии, даты изготовления, срока годности, мер предосторожности, условий хранения, номера государственной регистрации, информации о подтверждении соответствия и снабжают инструкцией по применению.

Хранят Дезолайн-Ф в закрытой упаковке производителя в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 °С до 35 °С.

Срок годности дезинфицирующего средства при соблюдении условий хранения – 3 года от даты изготовления.

Дезолайн-Ф не должен применяться по истечении срока годности.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Формалин, глутаровый альдегид и бензалкония хлорид, входящие в состав Дезолайна-Ф, обладают широким спектром действия в отношении возбудителей болезней животных и птицы первой, второй и третьей групп устойчивости: патогенных микроорганизмов (бруцеллы, клостридии, кишечная палочка, сальмонеллы, стафилококки, микобактерии туберкулеза и др.), вирусов (вирусы гриппа животных и птицы, вирус болезни Ауески, вирус болезни Марека, вирус болезни Ньюкасла, вирус ящура, вирусы чумы всех видов животных, в том числе вирусы классической и африканской чумы свиней и др.), грибов (аспергиллус, кандида и др.).

6. По степени воздействия на организм Дезолайн-Ф относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76); в рекомендуемых дозах не обладает местно-раздражающим и сенсибилизирующим действием.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. Дезолайн-Ф применяют для профилактической и вынужденной дезинфекции помещений для содержания животных, включая птиц; вспомогательных объектов животноводства, находящегося в них технологического оборудования и инвентаря по уходу за животными; кормокухонь и помещений для хранения корма; оборудования и помещений перерабатывающих цехов, цехов санитарного убоя, убойных пунктов, помещений санитарных боен; помещений и оборудования колбасных цехов; дезинфекционных барьеров и ковриков; транспортных средств для перевозки животных; инкубаторов; выводных шкафов, а также яиц перед помещением в инкубатор.

8. Обработку помещений проводят в отсутствии животных, включая птиц, продуктов убоя, сырья, продукции животного происхождения и кормов. Профилактическую дезинфекцию птичников проводят в присутствии птицы.

9. Обработку Дезолайном-Ф проводят влажным методом путем мелкокапельного орошения поверхностей помещений и элементов технологического оборудования с использованием дезустановок ДУК-1, ДУК-1М, АВД-1, УДП-3М, ЛСД-ЭП или аэрозольных генераторов АГ-УД-2, Циклон-1, САГ-1 или САГ-10.

10. Рабочие растворы готовят путем добавления соответствующих количеств Дезолайна-Ф к питьевой воде.

Соотношение Дезолайна-Ф и воды для приготовления различных концентраций раствора представлено в таблице.

Концентрация	Количество Дезолайн-Ф	Количество воды
0,4%	4 мл	До 1 литра
1%	10 мл	До 1 литра
1,5%	15 мл	До 1 литра
2%	20 мл	До 1 литра
4%	40 мл	До 1 литра

Приготовленный раствор должен быть использован в день приготовления.

11. Профилактическую дезинфекцию пустых помещений для содержания животных, инкубаторов, выводных шкафов, помещений для хранения корма и складов, а также вспомогательных объектов животноводства проводят 1% раствором Дезолайна-Ф из расчета 0,2 л/м^2 за не менее чем 24 часа до поступления животных и птицы, либо после освобождения помещения.

Вынужденную (текущую и заключительную) дезинфекцию названных объектов проводят 2% раствором Дезолайна-Ф из расчета 0,2 л/м^2 не менее чем за 24 часа до поступления животных, включая птиц, либо после освобождения помещения.

При африканской чуме свиней дезинфекцию помещений для содержания животных, помещений для хранения корма и складов, вспомогательных объектов животноводства, а также оборудования, инвентаря, кормушек, поилок проводят 2% раствором Дезолайна-Ф из расчета расхода 0,2 л/м^2 при экспозиции 6 часов.

Обработку птичников в присутствии птицы проводят, распыляя 0,4 % раствор дезинфицирующего средства по направлению к потолку либо методом аэрозольной обработки из расчета 5 мл/м^3. Профилактическую дезинфекцию проводят 1 раз в неделю.

Металлическое оборудование обрабатывают орошением 1% раствором до полного смачивания поверхности. Экспозиция 30 мин.

Пластиковое оборудование обрабатывают 2% раствором средства до полного смачивания поверхности. Экспозиция 2 часа.

По истечении экспозиции кормушки и поилки, а также места, доступные животным, необходимо тщательно промыть водой для удаления остатков Дезолайна-Ф. С остальных поверхностей удаление средства не требуется.

Помещения для хранения корма обрабатывают 2% раствором средства из расчета 0,2 л/м^2. Экспозиция 24 часа.

Помещения перерабатывающих цехов, а также цехов санитарного убоя, санитарных боен, убойных пунктов обрабатывают 1,5% раствором Дезолайна-Ф при норме расхода 0,4 л/м^2, экспозиция – 3 часа.

Помещения и оборудование колбасных цехов обрабатывают 1,5% раствором Дезолайна-Ф, норма расхода 0,3 л/м^2, экспозиция – 2 часа.

Яйца перед помещением в инкубатор обрабатывают погружением на 5 мин в 2% раствор дезосредства, или опрыскиванием до полного смачивания поверхности.

Дезолайн-Ф используют методом естественного испарения в выводных шкафах в течение 3 дней в период вывода цыплят. Для этого 4% раствором Дезолайна-Ф наполняют ванночку размером 20х30х10 см и помещают ее в выводной шкаф.

Дезинфекционные барьеры и коврики заполняют 1% раствором дезинфицирующего средства, которое меняют ежедневно.

Транспортные средства обрабатывают 2% раствором Дезолайна-Ф.

IV. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ

12. Контроль качества дезинфекции проводят в соответствии с методикой, изложенной в «Правилах проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» (2002).

V. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

13. Обработку животных Дезолайном-Ф проводит ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер или под их руководством специально обученные люди. Работу проводят в халатах, фартуках из прорезиненной ткани, резиновых перчатках и сапогах, головном уборе. Для защиты органов дыхания и глаз используют респираторы (РУ-60М, РПГ-67) и герметичные очки (ПО-2, ПО-3). Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу.

14. После работы необходимо снять спецодежду, вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

15. Пустую тару из-под Дезолайна-Ф утилизируют, не разрешается использовать ее для бытовых целей.

16. При несоблюдении мер предосторожности возможно острое раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей (першение в горле, носу, кашель, насморк) и глаз (слезотечение, зуд, резь). При необходимости следует обратиться к врачу.

17. При случайном попадании Дезолайна-Ф на кожу необходимо немедленно смыть его водой с мылом. При попадании в глаза, их промывают чистой проточной водой в течение 15 мин. При необходимости следует немедленно обратиться к врачу.

При попадании растворов средства в желудок пострадавшему дать выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать. При появлении признаков отравления следует обратиться к врачу.

18. Дезолайн-Ф необходимо хранить в недоступном для детей месте.

В связи с утверждением настоящей Инструкции утрачивает силу Инструкция по применению средства Дезолайн-Ф для дезинфекции объектов ветнадзора и профилактики инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, включая птиц, утвержденная Россельхознадзором 17 апреля 2006 г.

Инструкция разработана ООО «Ветбиохим», Москва (105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., 3/9).

Организация-производитель ООО «Ветбиохим» (355019, г. Ставрополь, ул. Биологическая, 18, ООО «Ветбиохим»).

Рекомендовано к регистрации и применению ФГУ «ВГНКИ».
Регистрационный номер ПВР-5-2.6/01641